



Reparto di Oculistica

Responsabile Dott. Giorgio Mattana

Sospensione Terapie Iperplasia Prostatica Benigna

Gentile Paziente,

nel caso Lei sia sotto trattamento farmacologico per **Iperplasia Prostatica Benigna** e a tal fine assuma farmaci della classe "G04CA - Antagonisti dei Recettori Alfa-Adrenalici", dovrà **sospendere la terapia 20 giorni prima dell'intervento** per poi riprenderla il giorno successivo all'intervento.

I nomi commerciali dei farmaci da sospendere sono i seguenti:

- ALBLOCK
- ALFUZOSINA
- ANTUNES
- BENUR
- BOTAM
- COMBODART
- FARALZIN
- JELNU
- LURA
- MITTOVAL
- OFUXAL
- OMNIC
- PRADIF
- PROSTATIL
- SILODOSINA
- SILODYX
- TAMLIC
- TAMSU ASTELLAS
- TAMSULOSIN
- TERAFLUSS
- TERAPROST
- TERAZOSINA
- UNOPROST
- URODIE
- UROFLUS
- UROMEN
- UROREC
- VESOMNI
- VOLUTSA
- XATRAL

La preghiamo di consultare il suo Specialista Urologo per eventuali terapie sostitutive.